

Sæsonens første hvalpesyge

Der er d. 21.05.14 blevet konstateret hvalpesyge i en farm ved Lemvig.

Farmen havde vaccineret forebyggende mod hvalpesyge i juli 2013, og det er sandsynligvis derfor, at der kun er relativt få voksne dyr, der har symptomer på hvalpesyge og smitten glider langsomt rundt i farmen. Dette bevirker dog også, at man risikerer at have sygdommen på farmen et stykke tid, inden man opdager det.

Lige nu er avlernes fokus på hvalpenes trivsel og risikoen for fedtede hvalpe, men *husk* at se efter, om der er skorper på snuden og omkring øjne og fortykkede poter på voksne dyr og/eller hvalpe, for så skal man slå alarm og få mistanke til hvalpesyge. Som avler kontakter man sin praktiserende dyrlæge ved mistanke om hvalpesyge. Dyrlægen sørger for indsendelse af materiale til undersøgelse for hvalpesyge, såfremt mistanken ikke kan afkræftes ved dyrlægens besøg på farmen.

Hvalpe med hvalpesyge syner hen, ser indtørrede ud, har fortykkede poter og skorper omkring snuden og øjnene, men idet hvalpene er små skal man kigge godt efter, for det kan nemt forveksles/camoufleres med fedtede hvalpe. Bugen på hvalpene med hvalpesyge er meget rynket i forhold til fedtede hvalpe (se billede).

Billede 1:

2 kuldsøskende. Hvalp til højre med hvalpesyge, se den rynkede bug.



Billede 2:

Samme hvalpe som på billede 1, se de fortykkede poter på hvalpen til højre og tyndt lag skorper omkring snuden



Billede 3:
Kuldsøskende, de 2 med hvalpesyge og fedtede. Se
rynkede bug.



Billede 4:
Han fra samme farm, skorper på snude og
fortykkede poter.

